

Como Puedo Obtener Ayuda?

Hay muchos recursos disponibles para quienes buscan ayuda, así como para familiares de adictos que necesitan apoyo. Póngase en contacto o visite el sitio web de cualquiera de las siguientes agencias que figuran a continuación para iniciar el proceso.

NCADA
(314) 962-3456

Respuesta de Salud del Comportamiento
Línea de Crisis, 24 horas
(314) 869-6644 or
(800) 811-4760

United Way of Greater St. Louis
Dial 2-1-1 or
1-800-427-4626

Missouriopioidstr.org/treatment
Proporciona una lista de programas de tratamiento financiados por el estado en Missouri



El Departamento de Policía de St. Louis County está interesado en las opiniones de los ciudadanos sobre nuestra agencia y sus empleados. Por favor, visite la dirección web a continuación y tome nuestra encuesta www.stlouiscountypolice.com/citizen-resources/citizensatisfaction-survey/



stlouiscountypolice.com

Sólo puede ser reproducido con autorización.
B-42a (06/19)

Servicios Policiales

Recursos	
Emergencia	911
No es una Emergencia	636-529-8210
TTY Personas Con Discapacidad Auditiva	636-529-8220 or 911
Dirección Territorial de Policía del Condado de St. Louis	
Policía Condado Del Norte	314-355-1200
Policía Condado Del Centro	314-615-0111
Policía Condado Affton Sur Oeste	314-615-4266
Policía Condado Del Sur	314-615-0162
Policía Condado De Fenton	636-349-8120
Policía Condado De Wildwood	636-458-9194
Policía Condado Del Oeste	314-615-0700
Policía Condado (Jennings)	314-385-4672

Opioides

Opioids
Spanish Language Version



St. Louis County Police Department
7900 Forsyth Boulevard
St. Louis, Missouri 63105

Policía del Condado de St. Louis
Una agencia acreditada internacionalmente



¿Qué son los opiáceos?

Los opiáceos son una clase de medicamentos que incluyen analgésicos recetados como:

- La Codeína
- El Fentanilo
- La Hidrocodona
- La Morfina Oxícodona
- La Heroína.

Actúan sobre los receptores opioides para producir efectos similares a la morfina y son muy adictivos. Cuando no se usan adecuadamente pueden llevar a la muerte.

¿Por Qué son tan Peligrosos?

La heroína y los medicamentos recetados para el dolor se derivan de la misma planta, la amapola. Ambos son conocidos como medicamentos opioides y no solo se vuelven más adictivos a medida que los toma, sino que, después de un uso prolongado, aumentan su riesgo de tolerancia.

A menudo, la incapacidad de obtener más opioides recetados puede aumentar el riesgo de consumo de heroína. Cuando se mezclan con alcohol, antihistamínicos, pastillas para dormir o sedantes como Xanax, Librium, Tranxene, Valium o Ativan, los opioides pueden disminuir o detener su respiración y corazón.

¿Cuáles son Algunos de los Efectos Secundarios?

Los opiáceos que se usan por poco tiempo pueden causar estreñimiento, náuseas, mareos, alivio del dolor, somnolencia, sedación o, en ocasiones, sensaciones de euforia. Es tan importante que si un médico le prescribe estos medicamentos, debe:

- Tómelos exactamente según lo prescrito.
- Nunca tome una dosis más alta.
- No conduzca ni opere maquinaria.
- Coloque los opioides en un cajón o gabinete cerrado con llave para evitar el uso indebido por parte de otras personas.
- Deseche de forma segura su medicamento vencido o no utilizado al consultar a su farmacéutico local o participar en el evento de devolución de drogas del departamento de policía local.

El uso a largo plazo de estos medicamentos a menudo es variado, pero puede incluir:

- Somnolencia y letargo.
- Paranoia, depresión o confusión.
- Respiración lenta o daño cerebral.
- Prurito y sudoración.
- Náuseas, vómitos y sequedad de boca.
- Mayor sensibilidad al dolor.
- Hinchazón y estreñimiento.
- Daño hepático.
- Dependencia.

¿Cómo Reconoces una Sobredosis?

Si sospecha que alguien tiene una sobredosis, llame al 911 de inmediato. Administrar respiración de rescate y naloxona (Narcan) si está disponible. Alguien puede estar tomando una sobredosis si:

- No responden a tu voz o te sacude.
- Tener pupilas puntiagudas.
- Tiene respiración superficial o está haciendo sonidos de gorgoteo.
- Tener labios o uñas azules o grises.
- Su cara es pálida o húmeda.

¿Cómo Puedo Actuar?

La adicción a los opioides es la causa principal de muerte accidental en los Estados Unidos. Puede marcar la diferencia al actuar y actuar haciendo lo siguiente:

- Deseche de inmediato sus medicamentos recetados no utilizados.
- Si sospecha que un ser querido está en riesgo de una sobredosis de opioides, obtenga un kit Narcan y tome la breve capacitación sobre cómo administrarlo.
- Conocer los signos de una sobredosis.